



# Nutrimed

Egészségközpont  
és endoszkópos labor

## Vizsgálatok leírása:

### Inhalatív Prick tesztsor:

bőrteszt, elkészül 20-40 perc, tartalma: korán virágzó fák,nyír, mogyoró, parlagfű, fekete üröm, lándzsás utifű, Alternaria alternata(tenuis), Cladosporium herbarum, Dermatophagoides pteronyssimus(poratka), Dermatophagoides farinae(lisztatka), tollkeverék(liba, kacsatoll), kutyaszőr, macskaszőr, közép időben virágzó fák, 5fű keveréke, lágyszárúak keveréke, gabona keverék, candida albicans, magyar kőris, platán

### Nutritív Prick tesztsor:

bőrteszt, elkészül 20-40perc, tartalma-

1.Fehérjék:laktalbumin, laktoglobulin, kazein, tojássárgája, tojásfehérje, halkeverék 1, halkeverék 2., ponty, marhahús, sertéshús, csirkehús, kecske kazein, kacska, liba, pulyka, juh, szardínia, tonhal, búza, szója

2.Zöldségek: napraforgó, paradicsom, paprika, zöldborsó, spárga, bab, karfiol, káposzta, spenót, sárgarépa, fehérrépa, burgonya, rozsliszt, kukoricaliszt, búzaliszt, padlizsán, tök, rizs, céklát

3.Gyümölcsök:narancs, citrom, grapefruit, alma, körte, szamóca, őszibarack, sárgabarack, cseresznye, gesztenye, szőlő, kiwi, dinnye, ananász, banán, málna, mogyoró, földimogyoró, mandula, dió, szilva, görögdinnye

4.Fűszerek:kakaó, tea, kávé, vanília, fahéj, édeskömény, fokhagyma, vöröshagyma, zeller, petrezselyem, bors, bazsalikom, szurokfű(oregano), zsálya, kakukkfű, sáfrány, élesztő, mustár, kapor, oliva

### Spec IgE / allergiavizsgálat vérből 30 allergén):

vénás vérvétel, elkészülés max. 5 munkanap, tartalma- földimogyoró, szójabab, mogyoró, dió, rák/garnélarák, tőkehal/lazac, tintahal/kagyló, borsó, sárgarépa, zeller, alma, narancs, kiwi, burgonya, búzaliszt, rozsliszt, paradicsom, étkezési paprika, hagyma, mangó, banán, tojásfehérje, tojássárgája, tej, lactoalbumin, lactoglobulin, kazein

### Spec IgE (allergiavizsgálat vérből 20 allergén):

vénás vérvétel, elkészülés max 7 munkanap, tartalma:

tojássárgája, tojásfehérje, tej, kazein, szezám, búza, rozs, szójabab, mandula, mogyoró, földimogyoró, dió, őszibarack, zeller, paradicsom, burgonya, alma, sárgarépa, tőkehal, rák



# Nutrimed

Egészségközpont  
és endoszkópos labor

## **Spec IgE (allergiavizsgálat vérből, inhalatív sor, 20 allergén):**

vénás vérvétel, elkészülés max 7 munkanap, tartalma: Macska szőr/hám, Kutya hám, Dermatophagoides pteronyssinus, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Éger, Nyír, Mogoró, Tölgy, Fűz, Perjefélék, Réti komócsin, Rozs, Liba toll/Csirke toll/Kacsa toll/Pulyka toll, Parlagfű, Feketeüröm, Lándzsás útifű

## **Spec IgE( allergiavizsgálat vérből inhalatív sor, 36 allergén):**

vénás vérvétel, elkészülés max 7 munkanap, tartalma:- konídiumos gomba, élesztőgomba, ecsetpenész, juharfakeverék, fakeverék 1. (enyves éger, fehér nyír, mogyoróakác), kőris, tölgy, platán, nyárfakeverék, disznóparéj, csomós ebír, réti komócsin, réti perje, csillagpázsit, nád, természetett rozs, kukorica, természetett zab, repce, búza, parlagfű keverék, lándzsás utifű, fekete üröm, sóska, kanadai aranyvessző, szarvasmarha hám-antigén, macska hám-antigén, kutya hám-antigén, ló hám-antigén, hörcsög hám-antigén, csótány, tollkeverék (csirke, kacsa, liba) poratka 1. ,poratka 2.

## **Spec IgG4( allergiavizsgálat vérből 30 allergén)**

vénás vérvétel, elkészülés max 5 munkanap, tartalma:-tej, tojásfehérje, tojássárgája, zab, rizs, glutén, kukorica, rozsliszt, búzaliszt, szójabab, élesztő, dió, mogyoró, mandula, földimogyoró, csirkehús, pulykahús, sertéshús, borjúhús, tonhal, borsó, bab, zeller, sárgarépa, vöröshagyma, paradicsom, paprika, alma, narancs, banán

## **Spec IgG4 Speciális kiegészítő panel I.**

kecsketej, camembert sajt, ementáli sajt, feta sajt, földieper, őszibarack, sárgadinnye, görögdinnye, kivi, mandarin, szőlő, méz, lazac, garnélarák, kagyló, kesudió, pisztácia, tökmag, napraforgómag, gesztenye, olívbogyó, burgonya, fokhagyma, bors, uborka, petrezselyem, kakaó, fahéj, vanília, gomba

## **Spec IgG4 Speciális kiegészítő panel II.**

feketeáfonya, gránátalma, licsi, lime, nektarin, szeder, datolya, papaya, grapefruit, bazsalikom, ánizs, koriander, szegfűszeg, kömény, curry, kapor, tárkony, édeskömény, gyömbér, kamilla, oregánó, kókusz, édesgyökér, ruccola, zsálya, brazil dió, mazsola, tofu, repcemag, golgota gyümölcs

## **Spec IgG (ELISA- 46 allergén FOOD DETECTIVE teszt)**

1 csepp vér ujjbegyből, elkészülés 2 óra, tartalma: zab, búza, rizs,



# Nutrimed

Egészségközpont  
és endoszkópos labor

kukorica, rozs, durum búza, glutén, mandula, brazil dió, kesudió, tea, dió, tehéntej, teljes tojás, csirke, bány, marhahús, sertés, fehérhalmix (foltos tőkehal, tőkehal, sima lepényhal), édesvízi mix (lazac, pisztráng), tonhal, rák- és kagylókeverék, brokkoli, káposzta, sárgarépa, póréhagyma, burgonya, zeller, uborka, paprikamix (piros, zöld, sárga), zöldségmix (borsó, lencse, bab), grapefruit, dinnyemix (sárga és görög), földimogyoró, szójabab, kakaóbab, alma, fekete ribizli, olajbogyó, narancs és citrom, földieper, paradicsom, gyömbér, fokhagyma, gomba, élesztő

## **Spec IgG (fehérje chip- 220 allergén)**

4-5 csepp vér ujjbegyből elkészülés 10 munkanap,

### **Tartalma:**

#### **- Gyümölcsök:**

alma, ananász, avokádó, banán, citrom, cseresznye, datolya, eper, feeper, fekete áfonya, fekete ribizli, füge, görögdinnye, gránátalma, grapefruit, gujava, kivi, körte, licsi, lime, málna, mandarin, mangó, mazsola, narancs, nektarin, olajbogyó, őszibarack, papaja, paradicsom, rebarbara, ribizli, sárgabarack, sárgadinnye, szeder, szilva, szőlő, vörösáfonya,

#### **- Húsok:**

bányhús, bivaly, borjúhús, csirkehús, disznóhús, fogolyhús, fürjhús, kacsahús, kecskehús, lóhús, marhahús, nyúlhús, osztriga, pulykahús, rötvad (szarvas-, őzhús), vaddisznóhús

#### **- Gyógy- és fűszernövények**

aloe vera, ánizs, babérlevél, bazsalikom, bors (fekete / fehér), borsmenta, cayenne-bors, csalán, curry, édesgyökér, fahéj, fokhagyma, gingek, ginzeng, gyömbér, kakukkfű, kamilla, kapor, komló, koriander (levél), kömény, majoranna, menta, mustármag, petrezselyem, rozmarin, sáfrány, szegfűszeg, szerecsendió, tárkony, vanília, vörös chili, zsálya

#### **- Tej, tejkészítmények**

alfa-lactalbumin, béta-lactoglobulin, bivalytej, juhtej, kazein, kecsketej, tehéntej, tojásfehérje, tojássárgája



# Nutrimed

Egészségközpont  
és endoszkópos labor

## - Olajos magvak

dió, fenyőmag, földimogyoró, kesudió, kókusz, makadámdió, mandula, mogyoró, paradió, pisztácia, tigrisdió / földimandula

## - Zöldségfélék

amarantusz, articsóka, bors, brokkoli, burgonya, cékla, cikória, csicseriborsó, cukkini, édesburgonya, édeskömény (levél), fehér, karóbab, fehérrépa, fejes saláta, hagyma, jucca, káposzta, vöröskáposzta, kapribogyó, karfiol, kelbimbó, kobaktök / futótök lencse, mángold, mogyoróhagyma, padlizsán, paprika, póréhagyma, ruccola, sárgarépa, spárga, spenót, széles bab, szójabab, torma, uborka, vizitorma, vörös vesebab, zeller, zöldbab

## - Gabonafélék

répa búza, búzakorkorpa, durumbúza, gliadin, gríz, köles, kukorica, kuskusz, lenmag, maláta, pohánka, quinoa, rizs, rozsliszt, tönkölybúza, transzglutamináz, zab

## - Halak és tenger gyümölcsei

ajóka, alga espagum, alga spirulina, alga wakame, angolna, parti csiga, csuka, doradó, fekete sügér, fekete tökehal, fésűs kagyló, foltos tökehal, garnélarák, hering, homár, hüvelykagyló, kacsakagyló, kardhal, kaviár, kék kagyló, kemény- vagy pénzkagyló, lazac, lepényhal, makréla, naphal, osztriga, ördögghal, pisztráng, polip, ponty, rombuszhal, sügér, szardínia, szívragyló, tarisznyarak, tintahal, kalamári tintahal, szépia tonhal, tökehal

## - Egyebek

fekete tea, zöld tea, agar-agar, élesztő, gesztenye, gomba, kakaóbab, kávé, kóladió, méz, nádcukor, napraforgómag, repcemag, szentjánoskenyér, szezám, tápióka

## OAS(Oralis allergia szindróma) I.

(parlagfű, fekete üröm, zeller, paprika, paradicsom, sárgarépa, uborka, petrezselyem, görögdinnye, kivi, kamilla, 12 fű keveréke)

## OAS II.

(12 fű keveréke, mandula, meggy, őszibarack, burgonya, szója, földimogyoró, bab, borsó, rozsliszt, búzaliszt, szezám)



# Nutrimed

Egészségközpont  
és endoszkópos labor

## OAS III

(nyírpollen, zeller, mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, kivi, sárgarépa, burgonya, szója, 12 fű keveréke)

## Spec IgG(108-as panel)

árpa, cseresznye, brokkoli, mandula, glutén, szőlő (fehér, kék), sárgarépa, kesudió, zab, kivi, zeller, kakaóbab, rozs, citrom, chili, mogyoró, tönköly, nektarin, uborka, földimogyoró, búza, narancs, torma, pisztácia, hajdina, ananász, póréhagyma, szezám, lenmag, eper, olajbogyó, napraforgómag, kukorica, görögdinnye, hagyma, dió, köles, körte, burgonya, kókusz, rizs, szilva, vöröskáposzta, Gomba mix 1, Gomba mix 2, marhahús, grapefruit, paradicsom, csirke, őszibarack, fehér répa, folyami rák, bárány, datolya, cukkini, lazac, sertés, bazsalikom, articsóka, tonhal, pulyka, bors (fekete, fehér), spárga, kagyló, tehéntej, fahéj, spenót, garnélarák, tojásfehérje, tojássárgája, fokhagyma, zöldbab, szardella, mustármag, borsó, kardhal, kecskesajt, szerezsendió, szójabab, pizstráng, kecsketej, oregánó, lencse, nyelvhal, juhtej, petrezselyem, fehérbab, tőkehal, juhsajt, borsmenta, saláta, sörélesztő, joghurt, mák, kukoricasaláta, sütőélesztő, padlizsán, rozmaring, alma, méz, cékla, kakukkfű, sárgabarack, kávé, kaliforniai paprika, vanília, banán, fekete tea

## Molekuláris (komponens alapú) allergia

**Inhalatív allergia** kérhető komponensei: nyírfa, réti komócsin, nyár végi gyomnövények (fekete üröm, parlagnyír), poratka

**Nutritív allergia** kérhető komponensei: tej, tojás, földimogyoró, mogyoró, dió, búzaliszt, szójabab, rák, gyümölcs (alma, őszibarack)

**Egyéb kérhető komponensek:**

- Rovarméreg panel I (méh, darázs)
- Rovarméreg panel II (méh, darázs, lódarázs, európai papírdarázs)
- Bromelain
- 

Gyermek panel: tej, tojás, földimogyoró

## Egyedileg kérhető allergének:

### Gabona:

Árpa, Hajdina, Közöséges köles, Rókafarkú köles, Glutén, Japán köles, Lenmag, Csillagfürt mag, Kukorica, Zab, Quinoa, Rizs, Rozs, Szezám, Tönköly búza, Búza, Élesztő

**Halak, Páncélosok, Puhatestűek:** Abalon kagyló / Kaliforniai ehető kagyló, Ajóka, Ehető kékkagyló, Harcsa, Spanyol makréla, Ehető kagyló, Rák, Édesvízi rák, Angolna, Tőkehal, Arany lepényhal, Fűrészfogú sügér, Hekk, Laposhal, Hering, Fattyú makréla, Languszt, Homár, Makréla, Szárnyas rombuszhal, Polip, Gránátos sügér, Osztriga, Atlanti hosszúszárnyú kalmár, Lepényhal, Sárga tőkehal, Vörös csattogóhal, Lazac, Szardínia, Japán szardínia, Fésűkagyló, Kagyló- és rákfélék, Garnélarák, Csiga, Nyelvhal, Kalmár, Kardhal, Tilápia, Pizstráng, Tonhal, Északi süllő, Fehérhalak

**Zöldségek, Gyümölcsök:** Zöldalma, Sárgabarack, Spárga, Padlizsán, Avokádó, Bambusznád, Banán, Cékla, Szeder, Áfonya, Brokkoli, Kelbimbó, Káposzta, Csillaggyümölcs, Répa, Karfiol, Zeller, Cseresznye, Vörösfonya, Uborka, Datolya, Édeskömény, Görögszéna/ Görög lepkeszeg, Füge, Fokhagyma, Szőlő, Grépfrút, Guáva, Jákafa / Dzsekkfrút, Jujuba / Kínai Datolya, Kiwi, Citrom, Fejes saláta, Lime ,

Litchi, Mandarin, Mangó, Sárgadinnye, Gomba (Sampion), Olivabogyó, Vöröshagyma, Narancs, Papaya, Petrezselyem, Maracuja, Körte, Datolyaszilva, Kaki / Kakiszilva, Ananász, Szilva, Burgonya, Sütőtök, Málna, Ribizli, Csipkebogyó, Szójabab, Spenót, Eper, Gesztenye, Édesburgonya, Paradicsom, Görögdinnye,

**Tojás:** Konalbumin, Egész tojás, Tojásfehérje, Tojássárgája, Ovalbumin, Ovomukoid

**Hüvelyesek:** Szeges lednek / Szegesborsó, Csicsereborsó, Zöldbab, Lencse, Holdbab/Limabab/Gesztenyebab, Borsó, Vörös vesebab, Szójabab, Fehérbab

**Húsok:** Marhahús, Csirkehús, Szarvashús, Lóhús, Birkahús, Sertéshús, Nyúlhús, Pulykahús

**Tej:** alfa-laktalbumin (nBos d4), béta-laktalbumin (nBos d5), Szarvasmarha eredetű laktoferrin, Kazein, Cheddar típusú sajtok, Penészes sajtok, Tehéntej, Kecsketej, Kancatej, Forralt tej, Juhtej, Juhtej savó, Tejsavó

**Diófélék:** Mandula, Brazildió, Kesudió, Kókuszdió, Mogyoró, Makadámdió, Földimogyoró, Pekándió, Fenyőmag, Pisztácia, Dió

**Egyéb ételek:** Kakaó, Szentjánoskenyérfa, Kávé, Édeskömény mag, Guargumi, Gumiarábikum / Arabmézga, Méz, Komló (toboz), Csillagfürt mag, Maláta, Mustár, Mák, Tökmag, Repce mag, Cukorrépa mag, Tea, Tragantmézga

## Étel rekombinások

### -Természetes

rec. rACT d8 kiwiből  
rec. rApi g 1.01 zellerből  
rec. rAra h1 földimogyoróból  
rec. rAra h2 földimogyoróból  
rec. rAra h3 földimogyoróból  
rec. rAra h8 földimogyoróból  
rec. rAra h9 földimogyoróból  
rec. rBER e1, brazildióból  
rec. rCor a1 PR10, mogyoróból  
rec. rCor a8, mogyoróból  
rec. rCyp c1, pontyból (C. Carpio)  
rec. rGad c1, tökehalból  
rec. rGly m4, szójababból  
rec. rPen a1 Tropomiozin, garnélarák  
rec. rPru p1, őszibarackból  
rec. rPru p3, őszibarackból  
rec. rPru p4, őszibarackból  
rec. rTri a 19, Omega-5-gliadinból



# Nutrimed

Egészségközpont  
és endoszkópos labor

**Fűszerek:** Szegfűbors, Anizs, Bazsalikom, Babérlevél, Fekete bors, Kömény, Kardamom, Chili paprika, Fahéj, Szegfűszeg, Bíbortetű kivonat (Kárminvörös), Koriander, Curry, Kapor, Gyömbér, Zöldpaprika (Éretlen mag), Lestyán, Szerecsendió virága, Majoranna, Menta, Szerecsendió magja, Oregánó, Paprika, Sáfrány, Zsálya, Tárkony, Kakukkfű, Vanília

**Fű és gabonapollenek:** Bahiafű, Árpa, Bermudafű / Tarackfű / Csillagpázsit, Rozsnok, Fénymag / Kanáriköles, Ebír, Közönséges nád, Termesztett zab, Termesztett rozs, Termesztett búza, Franciaperje, Fenyércirok, Kukorica, Réti csenkesz, Réti ecsetpázsit, Réti perje, Óriás tippán, Perje, Sziki fű, Borjúpázsit, Mezei komócsin, Pelyhes selyemperje, Tarackbúza

**Gyógynövény pollen:** Takarmánylucerna, Kamilla, Palmer disznóparéj, Szerbtövis, Szörös disznóparéj, Ürömlevelű parlagfű, Pitypang, Sédkender, Keserű hamisüröm, Kerti seprűfű, Óriás parlagfű, Aranyvessző, Libatop, Japán komló, Csillagfűrt, Margaréta, Fekete üröm, Nagy csalán, Útifű, Repce, (borzas) Rézgyom, Homoki ballagófű, Laboda, Juhsóska, Cukorrépa, Napraforgó, Közönséges falgym, Ágas falgym, Évelő parlagfű, Fehér üröm, Fodros lórom

**Fa pollen:** Akác, Amerikai bükk, Kazuárfa, Amerikai mocsárciprus, Viaszbokor, Kőrislevelű juhar, Cédrus, Szil, Gesztenye, Közönséges nyír, Nyár fa, Ciprusfa, Datolya, Amerikai duglászfenyő, Bodzafa, Szilfa, Eukaliptusz/gumifa, Magas kőrís, Hamvas éger, Ostorfa, Mogyoró, Gyertyán, Közönséges vadgesztenye, Európai ciprus/Örökzöld ciprus, Japánciprus, Hárs, Közönséges platán, Olajos kajepufta, Meszkito-fa, Oregoni boróka, Eperfa, Tölgy, Olajpálma, Olajfa, Kék palo verde, Pekándió, Borsfa, Monterey-fenyő, Fagyal, Királynőpálma, Óriás tuja, Vörös eperfa, Keskenylevelű ezüstfa, Seprűzanót, Lucfenyő, Amerikai ámbrafa, Virginiai örökzöld tölgyfa, Dió, Fehér kőrís, Bolyhos hikori, Simafenyő, Kecskefűz

**Felhám és tollak:** Hullámos papagáj tollak, Teveszőr, Kanárimadár tollak, Macska hám és szőr, Baromfi toll, Csincilla hám, Tehénszőr, Szarvas hám, Kutyaszőr, Kacsa tollak, Vadászgörény hám, Pinty tollak, Róka hám, Versenyegér hám, Kecske hám, Liba tollak, Tengerimalac hám, Hörcsög hám, Lószőr, Nyérc hám, Egér, Egér hám, Ara papagáj tollak, Papagáj tollak, Galamb tollak, Nyúl hám, Patkány hám

**Atkák:** Lisztatka, Blomia tropicalis, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Dermatophagoides pteronyssimus, Euroglyphus mayne, Lakásatka, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae

**Rovarméreg:** Gabonaporva, Árvaszúnyog, Dongó, Német csótány, Közönséges csótány, Kecskearázs, Közönséges kislisztbogár, Lódarázs, Vörös tűzhangya, Gabonasziszik, Cladotanytarsus lewisi, Mézelő méh, Bögöly, Lisztmoly, Szúnyog, Moly, Papírdarázs, Déli papírdarázs méreg, Amerikai csótány, Fehérfőjű lódarázs, Sárga lódarázs

**Mikroorganizmusok:** Alternaria alternata penészgomba, Aspergillus flavus / Sárga penész, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger/Fekete penész, Aspergillus terreus, Aureobasidium pullulans/Fekete élesztő, Botrytis cinerea/Szürkerothadás, Candida albicans, Cephalosporium acremonium, Chaetomium globosum, Cladosporium herbarum/Korompenész, Curvularia lunata, Epicoccum purpura, Fusarium moniliformis,

6600 Szentes, Arany János utca 3

tel./fax.: +36 63 785 885 mobil: +36 20 326 3297



# Nutrimed

Egészségközpont  
és endoszkópos labor

Helminthosporium halodes, Malassezia fajok, Mucor racemosus, Penicillium frequentans, Penicillium notatum, Phoma betae, Pityrosporum orbiculare, Rhizopus nigricans/Kenyérpenész, Staphylococcus aureus Toxin A, Staphylococcus aureus Toxin B, Staphylococcus aureus Toxin C, Stemphylium botryosum, Toxikus sokk szindróma, Trichoderma viride, Trichophyton ment. var. goetzii, Trichophyton ment. var. interdigit., Trichophyton rubrum, Trichosporon pullulans, Ulocladium chartarum, Ustilago nuda/ valódi porüszög

**Foglalkozási allergének:** Abachi fa por, Alkaláz (Bacillus fajok), Alfa-amiláz, Murvafürt, Ananász bromelin, Ricinusmag, Chloramin T, Gyapot mag, Etilén-oxid, Fikusz fajok, Formaldehid / Formalin, Zöld kávébab, Hexahydrophthalic anhydrid, Izocianát HDI, Izocianát MDI, Izocianát TDI, Ispaghula, Kaucukfa latex, Tojás lizozim, Maxatase, Methylnetetrahydrophthalic anhydrid, Papaja papain, Pepszin, Foszfolipáz, Ftálsav-anhydrid, Savinase, Selyemlepke selyme, Selyemhulladék, Naprafogómag, Trimellitic Anhydride/ TMA, Sórák haltáp, Pamut nyers rostjai, cross-reactive carbohydrate determinants, Vízibolha haltáp, Közönséges lisztbogár, Ondófolyadék, Streptavidin, Tetramin haltáp, Dohánylevél



## B e t e g t á j é k o z t a t ó

### Gyomortükrözés/ gastroscopia

**Cél:**

a nyelőcső, gyomor és nyombél rendellenességeinek felmérése  
szövetteni mintavétel  
gyógykezelés elvégzése ( pl.: polyp levétel stb. ).

**Előkészület:** a vizsgálat előtt: 6 óra táplálék- és 4 óra folyadékmegvonás

**A vizsgálat menete:** vizsgálóágyon fekvve, bal oldalfekvésben történik a vizsgálat. Éhgyomorra, a garat helyi érzéstelenítése után egy hajlékony műszer kerül levezetésre a szájon át a nyelőcsövön, gyomron keresztül a nyombélbe. Az endoszkópon keresztül levegőt fújunk be, mert az üres gyomor falai összeesnek. A levegő enyhe feszülést, böfögést okozhat. A vizsgálat során egyenletes légvételeket javasolunk, a légutak szabadok, fulladás nem léphet fel. Nem szabad kapkodni a levegőt, a hyperventillatio izomgörcsöt okozhat. Az eszköz előre vezetése öklendezést provokálhat, ez normális reflex. Az esetleges tartalmat a vizsgálat közben leszívjuk, hányás nem jelentkezik. A vizsgálat fájdalommentes, ideje kb. 3-15 perc.

**A vizsgálat után:** a garatérzéstelenítés miatt a vizsgálat után 1 óráig nem étkezhet, nem ihat tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről, írásos és fényképes dokumentációt kap amennyiben szövetteni mintavétel történt, annak eredményére 10-14 napot kell várni szokatlan panasz esetén jelentkezzen a megadott telefonszámon

**LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK:**

az érzéstelenítőszer vagy a nyugtató injectio iránti túlérzékenység

a beavatkozással kapcsolatos vérzés

a tükrözéses művelet kapcsán fellépő szövődmény miatt 10.000 vizsgálatra átlagosan 1 estben sürgős műtét válhat indokolttá.

## B e t e g t á j é k o z t a t ó

### Vastagbéltükrözés/colonosopia Rövid vastagbéltükrözés/recto-sigmoideoscopia

**Cél:**

a vastagbél rövid szakaszán (kb 40 cm) vagy teljes hosszában a betegségek felismerése szövetteni mintavétel  
gyógykezelés elvégzése ( pl: polyp eltávolítása )

**Előkészület:** a vizsgálatot megelőző héten már ne fogyasszon apró magvas gyümölcsöt, magvas pékárút, paradicsomot, paprikát, uborkát, egyéb magokat. Igyon bőven folyadékot. A vizsgálat előtti napon még könnyű reggelit fogyaszthat, utána már csak szűrt gyümölcsleveket, de legpraktikusabb a tea vagy a szénsavmentes ásványvíz. A bevitt folyadék mennyisége minimum 4 liter legyen. Természetesen a cukorbeteg és azok, akik nem bírják a koplalást, vihetnek be kalóriát, illetve szénhidrátot (cukrot). Ez lehet cukros tea is, de megfelel napi 2-3 tápszer fogyasztása (ezek 2 dl-esek, iható rostmentes kiszerelesben). Utóbbival pontosan tudjuk azt is, hogy mennyi szénhidrátot vittünk be, ami a cukorbetegnek fontos. A másik döntő fontosságú lépés a megfelelő előkészítő (bél tisztító) készítmény pontos, utasítás szerinti használata.

Ha tükrözés reggel van: a bél tisztítót előző nap 16 órakor 1 tasakkal (2dl vízben feloldva) igya meg, majd a vizsgálat reggelén 06 órakor a második tasakkal. Ez után már a vizsgálatig ne fogyasszon folyadékot.

Ha a tükrözés délután vagy délután van: a bél tisztítót előző nap 18 órakor igya meg (2 dl vízben feloldva), majd a vizsgálat előtt 4 órával igya meg a második tasakkal. Ezután már ne fogyasszon folyadékot sem a vizsgálatig.

Székrekedés esetén a vizsgálatot megelőző 2. napon (tehát pénteki vizsgálat esetén szerdán) vegyen be reggel- este 2- 2 Dulcolax tabl- t, valamint a vizsgálat előtti napon reggel 1x2 Dulcolax tablettát. Ez után a fent leírtak szerint folytassa az előkészületet.

**GYÓGYSZERELÉS MEGVÁLTOZTATÁSA:** A vizsgálat előtt 5 nappal ne vegye be pl. Plavix, Ticlid (clopidogrel, ticlopidin) tartalmú, Aspirin (acetyl-salicilsav) tartalmú gyógyszereit, valamint Syncumar, Marfarin, Pradaxa, Xarelto (acenokumarol, kumarin, dabigatran, stb.) tartalmú egyéb vérhígító kezelést is fel kell függeszteni. **HEPARIN injekcióját a vizsgálat napján ne adja be!** Ezen szerek használatáról a vizsgáló orvost tájékoztatni kell! A gyógyszerek újratekérésének időpontjáról és mikéntjéről a vizsgáló orvosa dönt, elkezdni csak az Ő engedélyével szabad!

**A vizsgálat menete:** hashajtás, beöntés vagy ezek kombinációja után egy hajlékony műszer bevezetése a vastagbélbe egyidejű levegőbefúvással. Az eszköz kb. 3-5 percig tartó előre haladása kellemetlenséget okoz, melyet ellentartással, gyógyszeres előkészítéssel enyhítünk.



# Nutrimed

Egészségközpont  
és endoszkópos labor

A vizsgálat során az eszköz okozta mechanikus sérülés hatására vérzés, a vastagbél kilyukadása előfordulhat elsősorban olyan betegségek mellett, ahol a bélfal eleve beteg, vagy operatív beavatkozás történik. Ennek előfordulási aránya 1:2000 vizsgálat. A vizsgálat kellemetlenségeinek leküzdésére kérés esetén fájdalomcsillapító injectiót alkalmazunk, vagy szedálásban/altatásban történik a vizsgálat.

A körülményektől függően a vizsgálat kb. 10-60 percig tart. A vizsgálat után a puffadás érzése természetes.

A vizsgálat után a fent leírtak miatt kórházi megfigyelés válhat szükségessé.

## **LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK:**

az előkészítéssel összefüggő folyadékvesztés panaszokat okozhat  
érezéstelenítő vagy a nyugtató injectió iránt túlérzékenység jelentkezhet  
a beavatkozás vérzéssel járhat

tükrözéses művelet kapcsán fellépő szövődmény miatt 1.000 vizsgálatra 1 esetben sürgős műtét válhat indokolttá

A 15-60 percig tartó vizsgálat után kevés vérzés jelentkezhet. **Ha a vérzés nagy volumenű, ha a hasa puffadt, fájdalmas, lázas lesz, haladéktalanul jelezze vizsgáló orvosának!**

**SZEDÁLÁS:** Amennyiben szedálást kér a vizsgálatához, a vizsgálat során fellépő amnezia miatt gépkocsit vezetni, egyedül közlekedni nem tud. Kísérővel érkezzen. Kérjük, hogy 1-nél több kísérőt ne hozzon magával, gyermek esetén is max 2 főt!!

Szedálás (Dormicum, Midazolam) mellett a beteg nem alszik mélyen, csak bódult, érzékelése csökken. Viselkedése megváltozik, nem tud kontrollt gyakorolni érzelmein. A vizsgálat körülményeire nem emlékszik pontosan. A fenti szer mellé NoSpa, Algopyrin, Buscopan injectiot adunk görcsoldásra, fájdalomcsillapításra. **GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉGÉT EZEKRE A SZEREKRE ELŐRE JELEZZE!**

**ALTATÁS:** Ha narcosisban kéri vizsgálatát, előzetesen altathatósági vizsgálaton kell átesnie. Ekkor laborvizsgálat is szükségessé válhat. A narcosist altatóorvos végzi.

Altatás után megfigyelés szükséges. Csak a gasztroenterológus és az anaesztheziológus közös döntése után hagyhatja el a rendelőt.